



**COMUNE DI COLERE**  
Provincia di Bergamo

# STUDIO GEOLOGICO PER IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO




(l.r. 11 marzo 2005, n°12 - d.g.r. 22 dicembre 2005, n°8/1566)

Tavola 2  
SEZIONI GEOLOGICHE E STRATIGRAFIE

scala 1:5.000 febbraio 2008



**GeoTer**  
studio associato di geologia del territorio di Daniele Ravagnani e Sergio Santambrogio  
via G. Rossini, n.2 - 24020 - Ardesio (Bergamo) telefono: 034633663 fax: 034634784  
e-mail: geoter@virgilio.it - www.geoter.it



### LEGENDA

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Depositi glaciali argilloso-limosi con blocchi (gl).  |  | Materiale di riporto ghiaioso grossolano.  |
|  | Detriti di falda sciolti (dt); detriti di falda colonizzati da vegetazione o coperti da suolo (dti).  |  | Terreno torboso marrone scuro con abbondante frazione vegetale.  |
|  | Depositi terrazzati ghiaioso-limosi di origine fluviale (fg).   |  | Limo argilloso bruno chiaro con ghiaia.  |
|  | Formazione di San Giovanni Bianco (Carnico superiore): calcari grigio chiari e dolomie grigio giallastre in strati sottili alternate ad argilliti (SGB).          |  | Argille plastiche con ghiaietto sparso (a) o con ghiaia e ciottoli sparsi (b).   |
|  | Formazione di Breno (Carnico medio): calcari micritici grigio chiari stratificati e micriti fossilifere grigie con cicli peritidali (Br).                         |  | Ciottoli e ghiaia in matrice argilloso sabbiosa (a) o sabbiosa-ghiaiosa (b) con frammenti calcarei, arenacei/calcareo-marnosi o marnosi-argillitici. |
|  | Calcarea di Esino (Ladinico medio-superiore): calcari massicci da grigio scuri a grigio chiari o rosati, con breccie intraformazionali e livelli fossiliferi (E). |  | ghiaie eterogenee (calcari grigio chiari e scuri ed arenarie).   |
|  | Formazione di Wengen (Ladinico superiore): marne nere stratificate alternate ad arenarie verdastre con laminazioni interne ed intercalazioni argillitiche (W).    |  | Detrito grossolano costituito da ciottoli e grossi blocchi.  |
|  | Calcarea di Buchenstein (Ladinico inferiore): calcari grigio neri stratificati con abbondanti noduli e liste di selce nera ed interstrati argillitici (Bu).       |  | Arenarie, calcarei marnosi e rari calcari molto fratturati (Formazione di Wengen - Ladinico superiore).  |
|  | Calcarea di Prezzo (Anisico superiore): calcari micritici marnosi neri alternati a marne scheggieose e fissili, sottilmente stratificati (Pr).                    |  | Arenarie, calcari marnosi e rari calcari compatti (Formazione di Wengen - Ladinico superiore).   |
|  | Calcarea di Angolo (Anisico): calcari micritici da grigi a nerastri in grossi banchi con interstratificazioni argillitiche (A).                                   |  | Marne ed argilliti (Calcarea di Prezzo - Anisico superiore).   |
|  | faglia o frattura   |  |  |
|  | sovrascorrimento  |  |  |

